


Hur **Respinal**[®] används vid en opioidöverdos



Vad Respinal® är och vad det används för

Respinal® används för att upphäva effekten av känd eller misstänkt opioidöverdosering hos vuxna (t.ex. morfin, heroin, metadon, fentanyl, oxikodon eller buprenorfin).

Respinal® är en nässpray som används för akut behandling av opioidöverdosering eller misstänkt opioidöverdosering hos vuxna. Tecken på överdos inbegriper:

- andningsproblem
- allvarlig sömnhet
- ingen reaktion på höga ljud eller beröring.

Om du är i riskzonen för en opioidöverdos ska du alltid bära med dig ditt Respinal®.

Respinal® verkar endast under en kort tid för att upphäva effekterna av opioider medan du inväntar akut läkarvård. Det är inte en ersättning för akut läkarvård.

Tala alltid om för vänner och familj att du bär med dig Respinal®.

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel används för akut behandling av opioidöverdosering och måste ges av någon annan än du själv.

Respinal® ska ges direkt och ersätter inte akut läkarvård.

Tillkalla omedelbart ambulans, även om personen får tillbaka medvetandet.
RING 112.

En nässpray Respinal® innehåller endast en dos naloxon.

Var uppmärksam på symtom på akut abstinenssyndrom och andningssvårigheter:

Respinal® kan eventuellt orsaka för snabb upphävning av opioideffekten vilket kan ge upphov till akut abstinenssyndrom hos personer som är fysiskt beroende av opioider.

Symtom kan vara snabb hjärtfrekvens, högt blodtryck, värk i kroppen och magkramper, diarré, illamående, kräkningar, svettningar, feber, gåshud, darrningar eller skakningar, ändringar i beteende, inklusive våldsamt beteende, nervositet, ångest, upphetsning, rastlöshet eller irritabilitet, obehag eller olust-känsla, ökning av hudens känslighet, svårt att sova.

Effekten av vissa opioider kan vara längre än effekten av Respinal®. Även om du till en början svarar på behandlingen är det viktigt att du övervakas eftersom tecken och symtom på opioidöverdos, t.ex. andningssvårigheter, kan komma tillbaka. I sådana fall kan ytterligare doser Respinal® ges.

Det är viktigt att nässprayen inte laddas eller testas före användning eftersom detta tömmer nässprayen och du kommer då inte att få läkemedlet som du behöver. Använd en ny Respinal® nässpray om ytterligare doser är nödvändiga. Ytterligare doser kan ges 2–3 minuter efter den första dosen/de första doserna.

Bruksanvisning

1

Kontrollera symptom och reaktioner

• **Kontrollera reaktioner för att se om personen är vid medvetande.** Du kan ropa personens namn, skaka försiktigt om axlarna, tala med hög röst i örat, gnugga bröstbenet, nypa i deras öra eller nagelbädden på ett finger.


• **Kontrollera luftvägar och andning.** Se till att mun och näsa är fria från hinder. Kontrollera andning i 10 sekunder – rör sig bröstkorgen? Kan du höra andningsljud? Kan du känna utandningsluften mot din kind?

• **Kontrollera efter tecken på överdos,** t.ex. ingen reaktion på beröring eller ljud, långsam ojämn andning eller ingen andning, snarkningar, kippande andning eller uppstötningar, blå eller lila fingernaglar eller läppar.

Ge Respinal om en överdos misstänks.


2

Ring efter ambulans.
RING 112.



3

Placera patienten på rygg. Säkerställ att andningsvägarna är fria. Det rekommenderas att kontrollera och rensa bort allt som blockerar näsan före nässprayen ges.




4

Öppna den inre förpackningen genom att först avlägsna gummibandet och sedan trycka i mitten på de båda platta sidorna av plastförpackningen för att öppna den.




5

Stöd nacken och låt huvudet luta bakåt. För in munstycket i den ena näsborren. Tryck bestämt på kolven tills den klickar till för att ge dosen. Ta sedan bort munstycket från näsborren.




6

Placera patienten i stabilt sidoläge. Stanna kvar hos patienten tills ambulans anländer. Håll utkik efter en förbättring i patientens andningsnivå, vakenhet och respons på ljud och beröring.



7

Om patienten inte blir bättre ska en andra dos ges i den andra näsborren efter 2–3 minuter.



Kom ihåg

- Tid är viktigt, tveka inte att ge första hjälpen och att använda Respinal®
- Börja alltid med att säkerställa fria luftvägar och ring efter ambulans (112)
- Du kan inte skada en person genom att ge dem Respinal® nässpray
- Det finns ingen risk att skada dig själv genom att ge nässprayen till en annan person
- Inuti varje plastetui finns en snabbstartguide.

För mer information besök
www.respinal.se eller
skanna QR-koden



002/v01/SE

Senast granskat av
Läkemedelsverket (24.08.2020)

dne pharma as
Karihaugveien 22
1086 Oslo – Norway

+47 21 60 87 00
post@dnepharma.com
dnepharma.com

Business registry/
Foretaksregisteret:
NO 991 741 208 MVA